

## **НАПОРЕДНО ВЛИЈАНИЕ НА УРАС И КАН НА ОСНОВА НРК ВРЗ ПРИНОСОТ И НЕКОИ МОРФОЛОШКИ СВОЈСТВА КАЈ ПИПЕРКАТА**

В. Коцевски<sup>1</sup>, Д. Јакимов<sup>1</sup> и М. Јекиќ<sup>2</sup>

<sup>1</sup>ИРЕ Институт за земјоделство - Струмица

<sup>2</sup>Земјоделски факултет - Скопје

1990, Охрид, Македонија, Југословенски симпозиум: Интензивно одгледување на зеленчук и производство во заштитен простор, Зборник на трудови: 335-340.

Урасот, ново N ѓубриво (27% N) на нашата фабрика во Т. Велес споредено со КАН (27% N) во двегодишно полско испитување кај пиперката сорта "Куртова капија". Почвата е алкален алувиум, малку солена, сиромашна со хумус и средно обезбедена со фосфор и калиум. Кај приносот и некои морфолошки својства на пиперката Урасот даде нешто подобар ефект од КАН. Меѓутоа, овие разлики не се сигнификантни и се објаснуваат со малата засоленост на овие алувијални почви.

**Клучни зборови:** пиперка, урас, КАН, принос.