


УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

UDC 63(058)

ISSN 1409-987X



ГОДИШЕН ЗБОРНИК
2008
YEARBOOK



ГОДИНА 8

VOLUME VIII

GOCE DELCEV UNIVERSITY - STIP
FACULTY OF AGRICULTURE



**ГОДИШЕН ЗБОРНИК
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ**

YEARBOOK

GOCE DELCEV UNIVERSITY - STIP, FACULTY OF AGRICULTURE

Издавачки совет

Проф. д-р Саша Митрев
Проф. д-р Борис Крстев
Проф. д-р Илија Каров
Проф. д-р Блажо Боев
Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
М-р Ристо Костуранов

Editorial board

Prof. Sasa Mitrev, Ph.D
Prof. Boris Krstev, Ph.D
Prof. Ilija Karov, Ph.D
Prof. Blazo Boev, Ph.D
Prof. Liljana Koleva-Gudeva, Ph.D
Risto Kosturanov, M.Sc

Редакциски одбор

Проф. д-р Саша Митрев
Проф. д-р Борис Крстев
Проф. д-р Илија Каров
Проф. д-р Блажо Боев
Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
Проф. д-р Верица Илиева
Проф. д-р Љупчо Михајлов
Доц. д-р Душан Спасов

Editorial staff

Prof. Sasa Mitrev, Ph.D
Prof. Boris Krstev, Ph.D
Prof. Ilija Karov, Ph.D
Prof. Blazo Boev, Ph.D
Prof. Liljana Koleva-Gudeva, Ph.D
Prof. Verica Ilieva
Prof. Ljupco Mihajlov
Ass. Prof. Dusan Spasov, Ph.D

Одговорен уредник

Проф. д-р Саша Митрев

Editor in chief

Prof. Sasa Mitrev, Ph.D

Главен уредник

Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева

Managing editor

Prof. Liljana Koleva-Gudeva, Ph.D

Јазично уредување

Даница Гавриловска-Атанасовска
(македонски јазик)
М-р Марија Кукубајска
(англиски јазик)

Language editor

Danica Gavrilovska-Atanasova
(Macedonian)
Marija Kukubajska, M.Sc
(English)

Техничко уредување

Благој Михов

Technical editor

Blagoj Mihov

Редакција и администрација

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Земјоделски факултет
Бул „Крсте Мисирков“ бб
п.фах 201, 2000 Штип, Македонија

Address of editorial office

Goce Delcev University
Faculty of Agriculture
Krste Misirkov b.b., PO box 201
2000 Stip, R of Macedonia



СОДРЖИНА CONTENT

Саша Митрев, Мирко Спасеноски, Емилија Костадиновска Молекуларна детекција и карактеризација на фитоплазмите присутни кај виновата лоза во Македонија	
Sasa Mitrev, Mirko Spasenoski, Emilija Kostadinovska Molecular detection and characterization of grapevine phytoplasmas in Macedonia	
..... 7	
Илија Каров, Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ, Емилија Костадиновска <i>Mycosphaerella graminicola</i> (FUCKEL.) Schroter (Anamorf: <i>Septoria tritici</i> ROB ex DESM.) - причинител на сива дамкавост на листовите (септориоза) кај пченицата	
Ilija Karov, Sasa Mitrev, Biljana Kovacevic, Emilija Kostadinovska <i>Mycosphaerella graminicola</i> (FUCKEL.) Schroter (Anamorf: <i>Septoria tritici</i> ROB ex DESM.) - Causer of leaf blotch diseases (septoriosa) on wheat	
..... 19	
Верица Илиева, Даница Андреевска, Добре Андонов, Наталија Маркова Развојни и производно-технолошки карактеристики кај интродуирани генотипови ориз (<i>Oryza sativa</i> L.) во агроколошки услови на кочанскиот регион	
Verica Pieva, Danica Andreevska, Dobre Andonov, Natalija Markova Growth and productional - technological characteristics of introductional genotypes of rice (<i>Oryza sativa</i> L.) in agroecological conditions in the region of Kocani	
..... 27	
Илија Каров, Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ, Емилија Костадиновска Инвентаризација на паразитната микрофлора на пченицата и јачменот во Република Македонија	
Ilija Karov, Sasa Mitrev, Biljana Kovacevic, Emilija Kostadinovska Survey of barley and wheat parasitic microflora in the Republic of Macedonia	
..... 37	
Васка Сандева Историски развој и современа состојба на зелените површини во Град Скопје, Р. Македонија	
Vaska Sandeva Historical development and modern condition of the green areas in the city of Skopje, Republic of Macedonia	
..... 47	



Лилјана Колева-Гудева, Фиданка Трајкова, Васко Златковски Биотехнологија и биодиверзитет: аспекти на подобрување на генотипот на земјоделските култури Liljana Koleva-Gudeva, Fidanka Trajkova, Vasko Zlatkovski Biotechnology and biodiversity: aspects of improvement of genotype of agricultures	57
Мите Илиевски, Гоце Василевски, Драгица Спасова, Раде Млинар Седиментациона вредност на зрно од мека пченица произведена во систем на органско одгледување Mite Ilievski, Goce Vasilevski, Dragica Spasova, Rade Mlinar The sedimentation value in grain of aestivum wheat producing on organic cropping management system	67
Plamen Atanasov Marinov-Serafimov, Cvetanka Dimitrova, Ljupco Mihajlov Determination of survival and restoration ability of a soyabean stand on a natural background of weed infestation Пламен Атанасов Маринов-Серафимов, Цветанка Димитрова, Љупчо Михајлов Определување на преживувањето и регенеративната способност на посеви од соја при природни услови на заплевување	75
Ivan Saldzhiev, Dragica Spasova Cotton irrigation regime under conditions of regulated water deficit Иван Салџиев, Драгица Спасова Норми на наводнување на памукот со регулиран полски воден капацитет	87
Љупчо Михајлов, Петар Клетникоски Економски ефекти од производство на органска луцерка во услови на наводнување во Овче Поле Ljupco Mihajlov, Petar Kletnikoski Economical effects from production of organic alfalfa under irrigation in Ovce Pole	95
Мите Илиевски, Драгица Спасова, Милан Ѓорѓиевски Статусна состојба во производството на некои култури од фамилијата <i>Cucurbitaceae</i> во Република Македонија за периодот 2000-2006 година Mite Ilievski, Dragica Spasova, Milan Georgievski Production standing of same plants from <i>Cucurbitaceae</i> family in Republic of Macedonia from period 2000-2006	107
Критериуми за објавување во Зборникот	115
Criteria for publishing in the Yearbook	119



ПРЕДГОВОР

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, со донесување на Законот за основање на Државен универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, започна со работа на 27 март 2007 година како високообразовна институција со четири факултетски единици и со дисперзија на наставата во Штип, Струмица и Кочани. Денес, за само две години од своето постоење, оваа институција прерасна во еден од водечките високообразовни центри во Република Македонија, втор по големина, со 13 факултети и 1 висока школа и со дисперзија на наставата во 12 општини: Штип, Струмица, Кавадарци, Гевгелија, Кочани, Свети Николе, Винаца, Берово, Радовиш, Прилеп и Скопје. На прагот од третата академска година, во нашите современо опремени амфитеатри, предавални, лаборатории и кабинети, својата иднина ќе ја градат околу 10.000 студенти кои заедно со околу 500 вработени ќе ги доградуваат темелите на овој млад, но модерен и перспективен Универзитет.

Земјоделскиот факултет, како интегриран дел од Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, ги следи модерните и современите трендови на високото образование. Според потребите на пазарот на трудот во државава, наставата се организира во 4 општини и тоа: Штип, Струмица, Кавадарци и Свети Николе. Тригодишните студии се на Општа насока, а четиригодишните студии се организирани по модули: модул Агроменаџмент (Штип); модул Интегрално земјоделско производство (Струмица); модул Енологија (Кавадарци) и модул Преработка на земјоделски производи (Свети Николе).

Покрај наставно-образовната дејност, голем дел од своите активности Земјоделскиот факултет ги посветува на науката и истражувањето. Како плод од стручно-апликативната и научноистражувачката дејност на Земјоделскиот факултет произлегува и оваа издание на Годишниот зборник, што во континуитет се објавува по осми пат.

Македонското земјоделско производство има долгогодишно искуство и богата традиција, така што нашите земјоделски производи се познати по квалитет во регионов и пошироко. Инволвирањето на науката во аграрот е еден од нашите водечки приоритети, со што го унапредуваме производството на здрава храна по квалитет и по квантитет, придонесуваме за развојот на индустријата за преработка на земјоделските производи, влијаеме во управувањето на македонските природни ресурси, а со тоа непосредно и во развојот на руралната и урбаната средина.

Ова издание на Годишниот зборник на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ е уште една потврда за нашата секупуна активност и стремез за негување, подобрување и осовременување на македонското земјоделско производство.

Издавачки одбор
Штип, септември 2009 год.

Одговорен уредник
Ректор, проф. д-р Саша Митрев



INTRODUCTION

The “Goce Delcev” University – Stip, resumed operation following the enactment of the Law that founded it. The university opened on March 27th, 2007, and established itself as an institution of higher learning made up of four colleges and three affiliates located in Stip, Strumica and Kochani.

Today, a mere two years after its establishment, this university has developed into one of the leading centers of higher education in the Republic of Macedonia. It is now the second largest in the country, and consists of 14 colleges and affiliates in different municipalities, including Stip, Strumica, Kavadarci, Gevgelija, Kochani, Sveti Nikole, Vinica, Berovo, Radovish, Prilep and Skopje.

The university has entered its third academic year and already acquired state-of-the-art equipment for its amphitheatres, lecture rooms, laboratories and offices. In that short time 10.000 students and 500 employees came together to build their future and upgrade the foundation of this young, modern, but remarkably prosperous university.

As an integral part of the “Goce Delcev” University – Stip, the College of Agriculture pursued contemporary trends in higher education that complement the requirements of the national labor market. The college has organized its teaching and scientific work in four different municipalities: Stip, Strumica, Kavadarci and Sveti Nikole. The College of Agriculture, within its department of general studies that offers a three and a four year degree, is organized according to various modules: agricultural management in Stip, integrated agricultural production in Strumica, enology in Kavadarci and production and manufacturing of agricultural produce in Sveti Nikole.

The College of Agriculture dedicates a large portion of its activities to science and research, in addition to its educational/teaching function. This annual edition, the eight in a series, is the result of applied expertise and scientific research performed at the “Goce Delcev” University College of Agriculture.

Macedonian agricultural production has long experience and a rich tradition that has led to its excellent reputation in the broader region. Introducing science into the agrarian sector has been a priority in advancing the qualitative and quantitative production of healthy foods. This process contributes to the development of food manufacturing, and to the university’s scientific impact on the proper management of Macedonia’s natural resources. This has had a positive effect on the development of rural and urban environment.

This issue further confirms that our overall activity facilitates the goal of fostering, improving and modernizing Macedonian agricultural production.

Editorial Board
Stip, September, 2009

Editor in chief
Rector, Prof. Dr. Sasa Mitrev



UDC: 631.52

Прегледен труд
Revised paper

БИОТЕХНОЛОГИЈА И БИОДИВЕРЗИТЕТ: АСПЕКТИ НА ПОДОБРУВАЊЕ НА ГЕНЕТСКИТЕ РЕСУРСИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

Лилјана Колева-Гудева*, Фиданка Трајкова*, Васко Златковски*

Краток извадок

Светската популација за време на XX век бележи прираст со голема брзина, кога најбрзата милијарда (шестата милијарда) беше додадена кон човековата популација. Прирастот на населението бара повеќе ресурси на почва и вода за урбанизација, индустријализација и земјоделство. Овој додатен притисок врз почвените и водените ресурсите веќе ја има загрозувано животната средина. Затоа, развојот на модерната биотехнологија резултира со култури кои се отпорни и на биотички и на абиотички стрес. Од друга страна, организмите добиени со биотехнолошки метод покажуваат дека тоа е докажан, брз и стабилен механизам за подобрување и зголемување на генетските ресурси во земјоделството. *In vitro* техниките на растителна клетка, култури на ткиво и орган не ни се повеќе нови. Сите овие причини ни даваат добра основа за да го дискутираме значењето на широкиот земјоделски биодиверзитет, каде важноста на софистицираната биотехнологија е тесно поврзана со зголемувањето и подобрувањето на земјоделските генетски ресурси. Затоа соматската ембриогенеза, преку културата на антери од пиперка, е ефективен метод за добивање на хаплоидни и дихаплоидни хомозиготи. Оваа тема, со сите предности и недостатоци на методот, детално е презентирана и дискутирана во овој труд.

Клучни зборови: *биотехнолошки методи, андрогенеза, сорти пиперка*

* Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Земјоделски факултет, ул. „Крсте Мисирков“ бб, п. факс 201, 2000 Штип, Македонија; liljana.gudeva@ugd.edu.mk

* Goce Delcev University – Stip, Faculty of Agriculture, Krste Misirkov bb PO box 201, 2000 Stip, Republic of Macedonia; liljana.gudeva@ugd.edu.mk



BIOTECHNOLOGY AND BIODIVERSITY: ASPECTS OF IMPROVEMENT OF GENETIC RESOURCES OF AGRICULTURE CROPS

Liljana Koleva-Gudeva*, Fidanka Trajkova*, Vasko Zlatklovski*

Abstract

World population has increased at a tremendous pace during the 20th century when the fastest billion (the 6th billion) was added to the human population. Increase in population certainly requires extra land and water resources for urbanization, industrialization and agriculture. This extra pressure on land and water resources is already placing the environment under threat. Therefore, the development of modern biotechnology has produced crops resistant to both biotic and abiotic stress. On the other hand, products produced with the biotechnological method show this method to be a proven, fast and steady mechanism for improvement and increase of genetic resources in agriculture.

In vitro techniques of plant cell, tissue and organ cultures are no longer novel to us. Hence, we are in a good position to discuss the relevance of wide agricultural biodiversity, where the importance of sophisticated biotechnology is strictly related to increasing and improving agricultural genetic resources. Thus, somatic embryogenesis, through anther culture in pepper, is an effective method for obtaining the haploid and doublehaploid homozygote. This issue, with all the advantages and disadvantages of the method, is presented and discussed in details in this paper.

Key words: *biotechnological methods, androgenesis, pepper varieties*

1. Вовед

Република Македонија поседува значајна агробиолошка растителна разновидност како резултат на поволните географски и климатски карактеристики. Најголем дел од вкупната обработлива површина на државата е употребена за полјоделски и градинарски култури. Важноста на градинарските култури за овој регион е од огромно значење. Во најголем процент во регионот се одгледуваат пченица, домати и пиперки, а во Струмичката Котлина традиционално се одгледуваат најразлични сорти на пиперка за свежа консумација па сè до сорти за индустриска преработка, одгледувани во оранжерији, пластеници и на отворено.

Од друга страна, новите методи на растителната биотехнологија, што во последната деценија полека но сигурно почнаа да се применуваат и кај нас, во голема мера го зголемуваат и подобруваат агробиодиверзитетот. На Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ веќе подолг период, скоро една деценија, се работи на култура на растителни клетки



и ткива во *in vitro* услови на повеќе градинарски култури (Колева-Гудева и Спасеноски, 2001; Колева-Гудева и сораб., 2001). Особено внимание е посветено на култура на антери од пиперка, метод со кој се добиени повеќе андрогенетски линии (2002-2008). Овие линии, во последните неколку години (2005-2008), се предмет на компаративни истражувања во оранжерија, пластеник и на отворено. Нивните производствени, хранливи и технолошки карактеристики се испитуваат во континуитет, со крајната цел за подобрување и збогатување на генофондот на македонските сорти на пиперки.

2. Материјал и методи на работа

Во култура на антери од пиперка беа поставени 21 различни генотипови (*пиран*, *куртовска капија БГ*, *куртовска капија ТР*, *куртовска капија СР*, *куртовска капија ШТ*, *златен медал ШТ*, *златен медал СР*, *бонбона*, *слатко лута*, *везена лута*, *сиврија*, *феферона*, *калифорниско чудо*, *фехерозон*, *ротунд*, *притавит*, *доматовидна блага*, *тура*, *мајори*, *кинсем* и *витамин Ф*), а од добиените регенеранти во лабораториски услови успешно се аклиматизираа и адаптираа на нестерилни услови само 4 (*куртовска капија СР*, *златен медал СР*, *пиран* и *фехерозон*).

Од овој стартен материјал се изведени 11 андрогенетски линии кои се предмет на компаративни истражувања на карактеризација и селекција во оранжерија, пластеник и на отворено (Колева-Гудева и Трајкова, 2005, 2007; Колева-Гудева и сораб., 2007 б).

Истражувањата за андрогенетскиот потенцијал на испитуваните генотипови на пиперка во *in vitro* услови се изведувани според методот на Dumas de Valux (1981), користени се и други инкубациони медиуми со соодветни температурни стресови како: MS (Murashige и Skoog, 1962) и N (Nitsch, 1969) со третман на 25°C и LS (Linsmaer и Skoog, 1965) и NN (Nitsch и Nitsch, 1969) со третмен на 7°C.

2.1. Предности и негативности на методот култура на антери од пиперка во *in vitro* услови

Андрогенезата која се одвива во услови *in vitro* е биотехнолошки метод за добивање на хаплоидни единки. Тоа е сигурна постапка за добивање на хомозиготно хаплоидно или дихаплоидно потомство, каде вегетативното или генеративното јадро од Polenovoto зрно се стимулира да се развие во нова хаплоидна индивидуа без понатамошно оплодување.

Од друга страна, иако е сето тоа возможно многу видови од земјоделските култури немаат способност за успешна микропропагација на микроспората. Андрогенезата е доста рестриктивна појава и за жал



многу често видови кои имаат големо комерцијално значење се неуспешни генотипови во оваа постапка. Причините за оваа ограничена појава се од најразлична природа, како: потеклото на стартниот материјал, староста на цветните пупки, генетската одреденост за андрогенеза, инкубациониот медиум, составот на хормоните во медиумот, инкубациониот температурен третман и многу други познати и непознати причини (Колева-Гудева, 2005). Од тие причини, вршени се истражувања за андрогенетскиот потенцијал на најразлични медиуми со различни инкубационски температурни третмани од страна на многу истражувачи, со цел да се зголеми продуктивноста на оваа постапка (табела 1, табела 2).

3. Резултати и дискусија

Пиперките се непредвидливи култури во услови *in vitro* и поради тоа резултатите кои се добиваат со култура на клетки и ткива се умерени, а по сè изгледа дека културата на антери е единствен исклучок од тоа правило (Muyiko и Fary, 1997). Може да се каже дека сите испитувани генотипови не се способни за формирање на хаплоидни ембриоиди (Koleva-Gudeva et al., 2007; Koleva-Gudeva et al., 2009).

Механизмот на топлиот и ладниот температурен шок во индукцијата на андрогенезата е дискутиран од голем број на автори, а некои од нив се прикажани во табела 1. Температурните стрес-инкубационски третмани имаат за цел да ги поттикнат андрогенетските процеси, но до денес овој механизам во целост не е разјаснет. Врз основа на бројни истражувања е докажано дека топлиот третман од 35°C има поголем ефект од ладниот (Колева-Гудева, 2003а, 2003б; Koleva-Gudeva et al. 2007).

Друг релевантен фактор е и составот на хранливата подлога, за што исто така е посветено огромно внимание од научници кои работат на оваа проблематика (табела 2). Дали андрогенезата ќе тече во правец на делба на микроспората и формирање на ембриоиди, т.е. во правец на соматска ембриогенеза или пак ќе се формира калус т.е. во правец на калусогенеза, зависи најмногу од составот на подлогата и температурниот третман (Колева-Гудева, 2003 а, 2003 б).

4. Заклучок

Од поставените 21 различни генотипови на пиперка 12 покажаа андрогенетска способност за формирање на ембриоиди, а од 4: *куртовска капија*, *златен медал*, *фехерозон* и *пиран* е добиен семенски материјал. Од овој семенски материјал се изведени 11 андрогенетски линии кои во последните неколку години се предмет на континуирани и компаративни истражувања во оранжерија пластеник и на отворено.



Според Студијата за биодиверзитетот на Република Македонија (2003), во Република Македонија се признаени 129 домашни и 2.205 увезени сорти, кои се одомаќинети, каде пиперката е застапена со 5 домашни признаени сорти, 51 одобрени странски сорти и 18 одомаќинети странски сорти, што е доказ за големата агробилошка разновидност. Новите андрогенетски линии, кои се предмет на понатамошна карактеризација и селекција на пиперката, се потенцијал со кој не само што се зголемува агродиверзитетот на пиперката, туку тенденциозно се подобрува генофондот за селекција на земјоделските култури.

Со овој биотехнолошки метод битно го оплеменуваме генетскиот фонд на пиперката, кој е селектиран со децении во Ген банката во Струмица на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Литература

- Dolcet-Sanjuan R., Claveira E. (1994): Carbon dioxide enrichment and carbohydrates in androgenesis of *Capiscum annuum* L.. HortScience, 29: 465.
- Dolcet-Sanjuan R., Claveira E., Huerta A. (1997): Androgenesis in *Capiscum annuum* L. – Effects of carbohydrate and carbon dioxide enrichment. J Amer Soc Hort Sci, 122: 468-475.
- Dumas de Valux R., Chambonner D., Pochard E. (1982): *In vitro* anther culture in red pepper (*Capiscum annuum* L.): improvement of the rate of plant production in different genotypes by treatments at 35 deg C. Agronomie, 1: 859-864.
- Gonzales-Garcia J. (2002): Plant induction by anther culture of jalapeno pepper (*Capiscum annuum* L.). Yeast Genetics and Molecular Biology 2002, University of Wisconsin, Madison, USA, July 30-August 4, 2002. YGM 2002 Abstract #503.
- Irikova T., Rodeva V. (2004): Anther culture of pepper (*Capiscum annuum* L.): The effect of nutrient media. Capsicum and Eggplant Newsletter, 23: 101-104.
- Kim J.Y., Kim Y.S., Yi G., Kim K.M. (2005): Anther culture of transgenic pepper (*Capiscum annuum* L.). Korean Journal of Breeding, 37: 241-246.
- Колева-Гудева Л. и Спасеноски М. (2001): Ефектот на некои цитокинини врз органогенезата на пиперката (*Capsicum annuum* L.). Годишен зборник на Институт за јужни земјоделски култури, Струмица. Вол 1: 31-35.
- Колева-Гудева Л., Митрев С. и Спасеноски М. (2001): Можности за примена на некои нови методи за производство на безвирусен посадочен материјал. Годишен зборник на Институт за јужни земјоделски култури, Струмица. Вол 1: 37-45.



- Колева-Гудева Л. и Спасеноски М. (2002): Индукција на калус од антери на пиперка. Годишен зборник на Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Вол 2: 59-68.
- Колева-Гудева Л. (2003а): Влијание на инкубацискиот третман врз андрогенезата на пиперка. Годишен зборник на Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Вол 3: 87-94.
- Колева-Гудева Л. (2003б): Култура на антери од пиперка (*Capsicum annuum* L.). Годишен зборник на Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Вол 3: 95-102.
- Колева-Гудева Л. и Трајкова Ф. (2005): Добивање на семе од пиперка добиена во *in vitro* култура од антери. Годишен зборник на Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Вол 4/5: 85-93.
- Колева-Гудева Л. (2005): Капсаицин – можен инхибирачки фактор во андрогенезата на пиперката. Годишен зборник на Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Вол 4/5: 75-83.
- Колева-Гудева Л., Трајкова Ф. (2007): Примена на андрогенезата како метод за подобрување на разновидноста на земјоделските култури. III Конгрес на еколози на Македонија. Зборник на трудови: 284-290.
- Koleva-Gudeva L., Spasenovski M., Trajkova F. (2007a): Somatic embryogenesis in pepper anther culture: The effects of incubation treatments and different media. *Scientia Horticulturae*, 111: 114-119.
- Колева-Гудева Л., Трајкова Ф., Спасеноски М. (2007б): Генетски ресурси на *Capsicum* spp. во Ген банката на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. III Конгрес на еколози на Македонија. Зборник на трудови: 303-309.
- Koleva-Gudeva, L., Trajkova, F., Dimeska, G., Spasenovski, M. 2009. Androgenesis efficiency in anther culture of pepper (*Capsicum annuum* L.). *Acta Hort. (ISHS)*, 830: 183-190.
- Kristiansen K., Andersen S.B. (1993): Effects of donor plant temperature, photoperiod, and age on anther culture response of *Capsicum annuum* L.. *Euphytica*, 67: 105-109.
- Linsmaer E.M., Skoog F. (1965): Organic growth factor requirement of tobacco tissue cultures. *Physiol Plant*, 18: 100-127.
- Litifi A., Wenzel G. (1994): Anther culture of hot and sweet pepper (*Capsicum annuum* L.): Influence of genotype and plant growth temperature. *Capsicum and Eggplant Newsl*, 13: 74-77.
- Matsubara S., Yamamoto M., Nab-Hyun J.O., Murakami K., Man H.J. (1998): Embryoid and callus formation from microspores by anther culture from July to November in pepper (*Capsicum annuum* L.). *Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University*, 87: 117-122.



- Mityko J., Fari M. (1997): Problems and results of doubled haploid plant production in pepper (*Capiscum annuum* L.) via anther and microspore culture. *Acta Horticulturae*, 447: 281-287.
- Morrison R.A., Koning E.R., Evans D.A. (1986b): Pepper. In: *Handbook of Plant Cell Culture*. Macmillan, New York, Vol. 4, 552-573.
- Morrison R.A., Koning E.R., Evans D.A. (1986a): Anther culture of interspecific hybrid of *Capsicum*. *Journal of Plant Physiology*, 126: 1-9.
- Munyon I.P., Hubstenberger J.F., Phillips G.C. (1989): Origin of plantlets and callus obtained from Chile pepper anther cultures. *In Vitro Cell Dev Biol*, 25: 293-296.
- Murashige T., Skoog F. (1962): A reserved medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol Plant*, 15: 473-497.
- Mythili J.B., Thomas P. (1999): Influence of ammonium to nitrate nitrogen ratio in different basal media on callusing response of *Capsicum (Capiscum annuum* L. *grossum* Sendt.) anthers. *Indian Journal of Experimental Biology*, 37: 314-316.
- Nitsch J.P. (1969): Experimental androgenesis in *Nicotiana*. *Phytomorphology*, 19: 389-404.
- Nitsch J.P., Nitsch C. (1969): Haploid plants from pollen grains. *Science*, 163: 85-87.
- Nowaczyk P., Kisiala A. (2006): Effects of selected factors on the effectiveness of *Capiscum annuum* L. anther culture. *J Appl Genet*, 47: 113-117.
- Özkum D., Tipirdamaz R. (2002): The effects of cold treatment and charcoal on the in vitro androgenesis of pepper (*Capiscum annuum* L.). *Turk J Bot*, 26: 131-139.
- Özkum D., Tipirdamaz R., Elliatioglu S. (2001): The relationship between the endogenous abscisic acid content of anthers and in vitro androgenesis in pepper (*Capiscum annuum* L.). *Acta Horticulturae*, 560: 327-329.
- Qin X., Rotino G.L. (1993): Anther culture of several sweet and hot pepper genotypes. *Capsicum and Eggplant Newsl*, 12: 59-62.
- Rodeva V. (2001): *In vitro* regeneration in anther culture of pepper (*Capiscum annuum* L.). *Scientific works of Agricult Univ, Plovdiv*, 3: 211-214.
- Rodeva V., Irikova T., Todorova V. (2004): Anther culture of pepper (*Capiscum annuum* L.): comparative study on effect of the genotype. *Biotechnology and Biotechnological Equipment*, 3: 34-38.
- Rodeva V., Grozeva S., Todorova V. (2006): *In vitro* answer of Bulgarian pepper *Capiscum annuum* L.) varieties. *Genetica (Serbia)*, Vol. 38, 2: 129-136.
- Rodeva V., Koleva-Gudeva L., Grozeva S., Trajkova F. (2007): Obtaining of haploids in anther culture of pepper *Capiscum annuum* L. and their including in the breeding process. *Goce Delcev University, Stip, Faculty of Agriculture, Yearbook 7: 7-17.*



- Sibi M., Dumas de Vaulx R., Chambonnet D. (1980): Androgenese *in vitro* chez le Piment *Capiscum annuum* L.: Impact des pertraitments sur le taux de plantes regenerees. In: Reunion C R (ed) EUCARPIA Application de la culture *in vitro* a l'Amelioration des Plantes Potageres. Versailles, April 16-18, 143-149.
- Sibi M., Dumas de Vaulx R., Chambonnet (1979): Obtaining halpoid plants by *in vitro* androgenesis in red pepper (*Capiscum annuum* L.). Annales de l'Amelioration des Plantes, 29:583-606.
- Simeonova N., Pandeva R., Zagorska N. (1990): Pollen and anther cultures of pepper (*Capiscum annuum* L.). V-th International Youth School, Conference on Genetics. Albena 11-15 Sept 1990, 186-189.
- Студија за биодиверзитетот на Република Македонија (Прв национален извештај(2003): Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје, стр.1-217.
- Supena E.D., Suharsono S., Jacobsen E., Custers J.B. (2006): Successful development of a shed-microspore culture protocol for doubled haploid production in Indonesian hot pepper (*Capiscum annuum* L.). Plant Cell Rep, 25: 1-10.
- Vagera J., Havranek P. (1985): *In vitro* induction of androgenesis in *Capiscum annuum* L. and its genetic aspects. Biologia Plantarum, 27: 10-21.



Табела 1. Ефектот на температурниот третман врз индукцијата на андрогенезата *in vitro*
Table 1. Effect of temperature treatment on indication of pepper androgenesis *in vitro*

Температурен третман Temperature treatment	Експлантати Explants	Ефекти Effect	Автори Authors
4°C	Цветни пупки Flower Buds	Стимулација на ембриогенезата Stimulate embryogenesis	Sibi et al 1979; Morrison et al. 1986a; Supena et al 2006
		Нема позитивен ефект No positive effect	Vagera and Havranek 1985; Munyon et al 1989; Özkum et al 2001; Özkum and Tipirdamaz 2002; Kim et al 2005
7°C	Антери Anthers	Стимулација на ембриогенезата Stimulate embryogenesis	Dolcet-Sanjuan et al. 1997
		Нема позитивен ефект No positive effect	Колева-Гудева и Спасеноски 2002; Колева-Гудева Л. 2003а; Koleva-Gudeva L. et al. 2007
9°C	Антери Anthers	Стимулација на ембриогенезата Stimulate embryogenesis	Dumas de Valux et al 1982; Supena et al. 2006
25°C	Антери Anthers	Нема позитивен ефект No positive effect	Колева-Гудева и Спасеноски 2002; Колева-Гудева 2003а, 2003б; Koleva-Gudeva et al. 2007
35°C	Антери Anthers	Стимулација на ембриогенезата Stimulate embryogenesis	Sibi et al 1980; Morrison et al. 1986b; Колева-Гудева 2003а, 2003б; Koleva-Gudeva et al. 2007; Rodeva et al. 2007



Табела 2. Ефектот на хранливата средина во култура на антери од пиперка
Table 2. Effect of culture media used for anther culture of pepper

Хранлива средина / Автор Medium / Author	Применето од други автори Applied by other authors	Резултати Results
Cp, R1 / Dumas de Valux 1981	Qin and Rotino 1993; Kristiansen and Andersen 1993; Litifi and Wenzel 1994; Mityko and Fari 1997; Dolcet – Sanjuan et al 1997; Rodeva et al. 2004, 2007; Колева-Гудева 2003а, 2003б; Koleva-Gudeva et al. 2007	Формирање на ембриониди Embryo formation
MS / Murashige and Skoog 1962	Matsubara et al 1998; Gonzales-Garcia 2002; Özkum and Tipirdamaz 2002; Irikova and Rodeva 2004; Rodeva et al. 2006, 2007; Supena et al 2006;	Ембриогенерски антери Embriogenetic anthers
	Колева-Гудева 2003а, Koleva-Gudeva et al 2007	Калус / Callus formation
Cm, Rm, Cp, R1, R2, RM, V3 Sibi et al. 1979; Chambonet 1988	Morrison et al 1986b; Rodeva 2001; Irikova and Rodeva 2004; Nowaczyk et al 2006; Simonova et al 1990	Ембриогенерски антери Embriogenetic anthers
B5 / Gamborg et al 1988	Mythili and Thomas 1999	Калус / Callus formation
N / Nitsch 1969	Koleva-Gudeva et al. 2007; Колева-Гудева и Спасеноски 2002; Колева-Гудева 2003а;	Калус / Callus formation
NN / Nitsch and Nitsch 1969	Dolcet-Sanjuan et al. 1994; Supena et al. 2006	Формирање на ембриониди Embryo formation
	Колева-Гудева и Спасеноски 2002; Колева-Гудева 2003а, 2003б; Koleva-Gudeva et al. 2007	Калус / Callus formation
LS / Linsmaer and Skoog 1965	Колева-Гудева и Спасеноски 2002; Колева-Гудева 2003а, 2003б; Koleva-Gudeva et al. 2007	Калус / Callus formation